

КОНФИБОЙ, ВРК (имдаклоприд, 200 г/л)

Действующее вещество препарата относится к классу неоникотиноидов.

Основной характеристикой этих действующих веществ является то, что они воздействуют на нервную систему вредителей – являются нейротоксинами проникая через кожные покровы или ротовую полость насекомых (контактно-кишечное воздействие).

Эффект воздействия наблюдается через 3-5 дней. Срок защитного действия от 14 до 28 дней.

Препарат обладает антистрессовым эффектом для культуры.

Действующее вещество проникает через листья и двигается по сосудам, но не проникает в плоды.

Конфидой, ВРК проявляет высокую активность против вредителей устойчивых к фосфорорганическим соединениям и пиретроидам.

Симптомы воздействия препарата проявляются сразу в том, что вредитель перестает питаться, а полная его гибель наблюдается через 2-3 суток.

Препарат эффективен только против питающихся стадий вредителя.

Покоящиеся фазы: яйца, куколки, нимфы он не убивает.

Лучшее время обработки от начала распускания бутонов до формирования завязей.

Недостаток – вреден для пчел.



Норма применения препарата, кг/га	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, сроки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
0,1-0,15	Яблоня, груша, айва	Тли, яблонный цветоед, яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1200 л/га	7 (1)

